

Informativni list

UPUTSTVA I PREPORUKE ZA PACIJENTE NA ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI

- 1.) Vama propisani lijek **Marivarin, Pelentan, Marcoumar ili Sintrom** usporava zgrušavanje krvi. Kod ozljeda postoji povećanja opasnost od krvarenja i otežanog zaustavljanja krvarenja.
- 2.) Lijek se mora uzimati **točno** prema uputama vašeg liječnika. Dnevna doza se ne smije, samovoljno povećavati niti smanjivati. Svako zaboravljeno uzimanje lijeka ili povećano doziranje smanjuje uspjeh terapije.
- 3.) Lijek se mora uzimati uvijek u isto vrijeme.
- 4.) Djelovanje lijeka se mora **redovito** kontrolirati laboratorijskom pretragom – PV (Protrombinsko vrijeme) izraženo u INR jedinicama.
- 5.) Uzimanje više lijekova, prije svega antibiotika, lijekova za spavanje, lijekova za srce i slično, utječe na djelovanje antikoagulantnog lijeka. Prije uzimanja takvih lijekova je neophodno konzultirati liječnika koji određuje dozu Vašeg antikoagulantnog lijeka.
- 6.) U slučaju posjete zubaru radi vađenja zuba ili nekog drugog kirurškog zahvata važno je istaknuti da ste na antikoagulantnoj terapiji.
- 7.) U koliko primjetite jače krvarenje zubnih desni, krvarenje iz nosa, krvarenje na sluznicama očiju ili modrice na koži cijelog tijela ODMAH se javite vašem liječniku.
- 8.) Preporuke kod ishrane (hrana sa puno K vitamina se ne preporučuje):

NE PREPORUČUJE SE:	PREPORUČUJE SE:
Zelena salata	Zeleni čaj
Zelena paprika	Mrkva
Kelj (sirovi)	Prokulice
Špinat (sirovi)	Zelje
Zelene mahune	Iznutrice
Kivi	Karfiol
Avokado	Brokula
Peršin	Žumanjak
Jabuke	Mlijeko i mlječni proizvodi
Žitarice	
Lijek ne uzimati sa mlijekom!	
Kod proljeva izazvanog lijekom pomaže sok od naranče, banane ili juha od mrkve.	

- 9.) Slijedeće bolesti utječu na djelovanje antikoagulantnih lijekova:

POJAČANO DJELOVANJE KOD:	SMANJENO DJELOVANJE KOD:
alkoholizma oštećenja jetre slabog srca povišene temperature pojačane funkcije štitnjače	debljine proljeva dehidracije smanjene funkcije štitnjače šećerna bolest